



КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ProPath® Zn 170

Кормовая добавка для животных.

При использовании в качестве коммерческой кормовой добавки продукт необходимо декларировать как цинк-аминокислотный комплекс. Американская ассоциация государственного кормового контроля (AAFCO) № 57.150.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

МИНЕРАЛЫ	Цинк	17.0%
ПОКАЗАТЕЛИ	Влажность	1.5 - 2.5%
	Сырая зола	34.6%
	Сырой протеин	35.4%
АМИНОКИСЛОТЫ	Глутаминовая кислота	22.0%
	Лизин	20.1%

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет	Бежевый
Текстура	Порошок
Характеристики частиц	Сыпучий, низкогигроскопичный продукт
Плотность	660 - 690 кг/м ³
Растворимость	Активное вещество растворимо в воде
Размер частиц	150 мкм < 75% < 355 мкм
Тип упаковки	Многослойный мешок
Вес упаковки	25 кг

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

При соблюдении указаний по применению комплекс ProPath® Zn 170 не представляет токсической опасности. Для получения подробной информации см. паспорт безопасности. Хранить в чистом, сухом месте. Следуйте указаниям на этикетке и расходуйте запасы в порядке их поступления, чтобы избежать истечения срока годности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

		г/голову/день	г/т	мг/кг СВ*
МОЛОЧНЫЙ СКОТ	Все виды			40
	МЯСНОЙ СКОТ			
МЯСНОЙ СКОТ	Нетели, телята на выращивании		380	
	Телята после отъема			30
	Коровы и быки	2.1		
	Скот при приемке на откорм			60
	Скот на откорме			60
ОВЦЫ	Все виды †	0.24		
КОЗЫ	Все виды †	0.3		
ЛОШАДИ	Все виды	2.12		
СВИНЬИ	Поросята †			300
	Ростовой корм /финишный корм †			300
	Свиноматки и хряки †			300
ПТИЦА	Все виды		250	
АКВАКУЛЬТУРЫ	Лососевые и морские рыбы			353
	Тилапии и пресноводные рыбы			471
	Креветки			353
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ	Собаки			590
	Кошки			441

* мг/кг корма/СВ, содержащегося в полноценном рационе.

† Рекомендуется двойная доза в период снижения потребления корма или высоких нагрузок.

МЯСНОЙ СКОТ: Рекомендации для молодняка на подкормке основываются на ежедневном потреблении 1% от массы тела.